


费弗氏杆菌（流感嗜血杆菌）

资料单




这种有时被称作流感嗜血杆菌的疾病是由费弗氏杆菌导致的。此病并非流感。流感嗜血杆菌的一种被称作B型嗜血杆菌（Hib）的菌型曾经是儿童细菌感染的最常见原因。



感染了流感嗜血杆菌的人咳嗽或打喷嚏时就会把病菌传给别人。

疾病类型

这些细菌会导致包括耳部感染在内的儿童和成人的多种疾病。较为严重的侵入型病症包括：




肺炎（肺部感染）



脑膜炎（脊柱及脑部覆盖膜的肿胀）



关节感染



脓毒血症

此病症的体征和症状依据受感染身体部位的不同而有不同。


预防



接种疫苗是预防B型嗜血杆菌病症的最好方法。疾病控制与预防中心建议新生婴儿应接种疫苗并在12-15个月的时候接种一剂加强针。对于非B型嗜血杆菌类的疾病目前尚无可用疫苗。

未接种全部疫苗的婴幼儿患病风险较大。B型嗜血杆菌最常见于年龄6-18个月的孩童。

要了解更多信息：



访问 www.maine.gov/dhhs/hflu 或者 www.cdc.gov/hi-disease。

您也可以拨打电话1-800-821-5821联系缅因州疾病控制与预防中心。