


Туберкульоз (ТБ)

Інформаційний бюлетень



Туберкульоз (ТБ) — це хвороба, яку спричиняє бактерія, що зазвичай уражає легені. Проте хвороба може вражати й інші частини тіла. Захворюють не всі інфіковані туберкульозом. У результаті виникають два стани, пов'язані з туберкульозом: Прихована туберкульозна інфекція (не заразна) і активна туберкульозна інфекція (заразна).



Коли людина з активним туберкульозом легень кашляє, чхає або співає, туберкульозні мікроби попадають у повітря. Люди поруч можуть вдихати ці мікроби.


Ознаки та симптоми



Кашель



Слабкість



Утрата ваги



Нічне потіння



Стиснення в грудях



Висока температура

У хворих на туберкульоз легень може спостерігатися кашель упродовж трьох і більше тижнів, біль у грудях і/або кашель із кров'ю. Інші симптоми залежать від конкретної ураженої частини тіла.



Якщо ви підозрюєте, що у вас туберкульоз, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Для виявлення прихованої туберкульозної інфекції лікар може призначити шкірну пробу (TST) або аналіз крові (IGRA). Якщо будь-який із цих тестів виявиться позитивним, необхідно провести рентгенографію грудної клітини. Активний туберкульоз лікується антибіотиками. Для лікування прихованого туберкульозу є профілактичні препарати.

Легенева та позалегенева форми



Захворювання на туберкульоз може спричинити легеневу інфекцію, яка вважається заразною для оточення. Туберкульоз може виникати також поза легенями і тоді не є заразним.

Хто може захворіти на туберкульоз?



На туберкульоз може захворіти будь-хто. Найбільшому ризику піддаються члени родини, друзі та колеги, що перебувають в одному повітряному просторі з людиною, хвору на туберкульоз легень.

До інших груп підвищеного ризику належать люди, що живуть або працюють групами; люди, які зловживають наркотиками або алкоголем; люди з такими захворюваннями, як діабет, ВІЛ-інфекція (вірус, що викликає СНІД) і деякі види раку; а також люди з недостатньою вагою. Люди, що приїжджають із країн із високим рівнем захворюваності на туберкульоз, також відносяться до групи підвищеного ризику.

Туберкульоз із множинною лікарською стійкістю



- Туберкульоз із множинною лікарською стійкістю (МЛУ) обумовлений стійкістю збудників туберкульозу до антибіотиків першого ряду.
- Коли виникає стійкість, один або кілька протитуберкульозних препаратів більше не можуть знищувати збудників туберкульозу.
- Туберкульоз із широкою лікарською стійкістю (ШЛУ) виникає, коли збудники туберкульозу стійкі до деяких протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду.
- Така стійкість може розвинути, якщо хворі туберкульозом не приймають протитуберкульозні препарати, призначені лікарем.
- ШЛУ та МЛУ-форми туберкульозу лікувати складніше та дорожче. Лікування займає також більше часу, ніж лікування нерезистентного туберкульозу.
- Ліки, використовувані для лікування ШЛУ і МЛУ-форм туберкульозу, можуть мати небезпечні для життя побічні ефекти.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайти:



1. www.maine.gov/dhhs/tb
2. www.cdc.gov/tb

Ви можете також зателефонувати до Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) штату Мен за номером 1-800-821-5821.